



# PERROS ADULTOS

## 7 PRIMEROS AUXILIOS

### 7.1 Consejos básicos

Si el perro sufre un accidente o enferma repentinamente lo primero que debemos hacer es mantener la calma. Tendremos a mano los teléfonos del veterinario o de la clínica de urgencias por si es necesario llamar para recibir las primeras indicaciones antes de llevarlo; también deberemos tener el teléfono del Servicio de Toxicología por si se ha ingerido algún producto tóxico.

#### Botiquín básico

Para practicarle los primeros auxilios necesitaremos un botiquín que contenga:

- medicamentos recetados por el veterinario (se los administraremos si nos lo indica por teléfono)
- jeringas estériles, gasas, esparadrapo y algodón
- agua oxigenada (3%) para desinfectar heridas leves y arañazos
- termómetro rectal (es importante que sepamos usarlo correctamente)
- pinzas para extraer cristales, espinas o garrapatas

#### Cómo actuar si está herido

Es básico que le pongamos el bozal (antes de empezar a hacerle las curas) ya que al sentir dolor puede que se enfurezca y nos muerda. No le pondremos nunca el bozal si está vomitando o se ahoga.

Podemos utilizar también una bufanda, un trapo de cocina o una venda: rodearemos su hocico con la venda y la ataremos con un nudo por debajo de la barbilla. La pasaremos por detrás de las orejas y la anudaremos de nuevo.

#### Cómo moverlo

Si creemos que sufre alguna lesión interna lo colocaremos con mucho cuidado encima de una tabla, manta, chaqueta o cualquier cosa que nos haga de camilla provisional.

Si el perro tiene lesiones menores lo transportaremos aguantando sus patas traseras sobre nuestro brazo donde también apoyaremos su estómago y su pecho; con el otro brazo sujetaremos la cabeza y el cuello.

Si el perro es ya más grande nos agacharemos y pasaremos un brazo al rededor de sus patas posteriores y lo subiremos.

SI tenemos que transportarlo en coche hasta el veterinario es conveniente que alguien nos acompañe para sujetar al perro mientras el otro conduce.

#### Cómo hacerle un vendaje

Le colocaremos al perro una gasa estéril (humedecida con agua fría) sobre la herida y pasaremos una venda por encima de la gasa; la sujetaremos con esparadrapo para que aguante hasta llegar a la clínica. No debemos utilizar algodón directamente sobre la herida ya que podría dejar hilos.

#### CONSEJO PRÁCTICO:

*los perros pueden tener miedo a algunas cosas que incluso nos parecerían extrañas; es normal, pero también lo es que los superen. Si no llegan a superarlos pueden llegar a convertirse en fobias y no serán capaces de superarlas solos. Si detectamos algún miedo muy irracional lo comentaremos con el veterinario, ya que es posible que necesite medicación.*

### 7.2 Cómo detectar y qué hacer en casos de ...

No hay que olvidar que estos primeros auxilios sólo son provisionales hasta que el veterinario visite y trate al perro. No debemos tomarlos como tratamientos definitivos.

#### Reacciones alérgicas

Los síntomas del perro van desde lagrimeo, picor en los ojos, cara hinchada o estornudos hasta dificultad respiratoria, colapso y pérdida del conocimiento. Si la alergia parece grave le llevaremos de inmediato al veterinario.

#### Hemorragia

Si el perro sangra mucho puede llegar a perder el conocimiento; para evitar esto y una mayor pérdida de sangre le aplicaremos un vendaje. Si la hemorragia es excesiva o si no para tras vendarle debemos llevarlo rápidamente al veterinario.



## PERROS ADULTOS

### 7 PRIMEROS AUXILIOS

#### Problemas respiratorios

Si notamos que el perro jadea, hace ruido al respirar o tiene cualquier otro síntoma como, por ejemplo, la lengua azul le llevaremos a veterinario sin pensarlo.

#### Fracturas

Observaremos si la fractura sangra y evitaremos que el perro se mueva. Si tenemos que transportarlo lejos envolveremos la fractura con algodón; inmovilizaremos la extremidad con un palo, un periódico enrollado o algo parecido y la vendaremos con suavidad.

#### Quemaduras

Si el perro sufre quemaduras de primer grado, es decir, piel enrojecida y pelo chamuscado, le aplicaremos una pomada para quemaduras; si las quemaduras han sido producidas por algún producto químico lavaremos la piel con agua abundante durante 10 o 15 minutos antes de llevarlo al veterinario.

#### Asfixia

Si el perro tiene algún elemento en la garganta que le está asfixiando intentaremos sacárselo: le mantendremos la boca bien abierta e inclinaremos su cabeza hacia arriba. Con cuidado intentaremos extraer el objeto con las manos. Si así no podemos, nos situaremos de rodillas detrás de él y le rodearemos con los brazos por debajo de sus costillas. Estrecharemos nuestros brazos varias veces presionando enérgicamente (pero no bruscamente). Si de esta manera tampoco lo conseguimos lo trasladaremos rápidamente al veterinario.

#### Ahogo

En el caso que el perro empiece a ahogarse lo mejor es llevarle sin perder un momento al veterinario de urgencias; no debemos intentar hacer la reanimación si no sabemos hacerlo correctamente. Lo que podemos hacer, por ejemplo, mientras le estamos trasladando, es ponerlo boca arriba durante unos diez o quince segundos y observar si reacciona positivamente.

#### Electrocución

En caso que el perro muerda un cable conectado o le pase la corriente a través de un enchufe o un aparato eléctrico, lo primero que debemos hacer es cortar la corriente rápidamente y apartarle pero sin tocarlo directamente; lo haremos con un palo o lo que tengamos a mano.

Probablemente se haya quemado de gravedad; puede que sea peor y que sufra insuficiencia respiratoria u otros síntomas. En cualquier caso lo llevaremos lo antes posible al veterinario.

#### Lesiones en los ojos

Si vemos que tiene algo en el ojo o que intenta rascarse lo primero que debemos hacer es evitar que él mismo se haga daño al intentarse tocar; tendremos la precaución de no querer sacarle nosotros mismos lo que pueda tener ya que podemos dañarle aún más así que le llevaremos al veterinario.

#### Congelación

No es nada extraño que algunas partes del cuerpo del perro sufran congelación si hace mucho frío; es el caso de las almohadillas, los pies, las orejas o la cola. Si observamos que tiene dolor, que la piel se ha enrojecido y está pálida y brillante rápidamente le llevaremos a un lugar caliente, y le cubriremos las partes congeladas con un trapo mojado con agua caliente; al rato volveremos a mojar el trapo de nuevo en agua caliente y lo aplicaremos hasta que veamos que la piel recupera su estado normal. Después de estas medidas urgentes, llevaremos el perro al veterinario para que verifique si se han producido lesiones graves por causa de la congelación.

#### Golpe de calor

Los perros no eliminan el calor sudando, ya que tiene pocas glándulas sudoríferas, solamente lo eliminan jadeando. En un lugar caluroso y sin ventilación la temperatura del perro puede aumentar excesivamente así que evitaremos estas situaciones.

Si jadea excesivamente, tienen fiebre alta y colapso, deberemos intentar bajarle la temperatura sumergiéndolo en agua fría hasta el cuello o mojándolo con una manguera durante diez minutos; también explicaremos hielo sobre su cabeza, y en cuanto baje la temperatura le llevaremos al veterinario.

#### Envenenamiento

Aunque los síntomas varían según el veneno controlaremos si tiene falta de coordinación, vómitos o diarreas graves, delirio, colapso o convulsiones. En cualquiera de estos casos llamaremos al Servicio de Toxicología o al veterinario; necesitarán saber qué le ha provocado el envenenamiento para poder tratarlo. No debemos provocar el vómito si no los lo dice el veterinario ya que algunos venenos son peores si se vomitan. Acudiremos al veterinario y, si tenemos el recipiente donde estaba el veneno, también se lo llevaremos.

#### Shock

Se da cuando el cuerpo reacciona ante algo grave. Se reduce el riego sanguíneo en el cerebro y en otros órganos vitales, por la cual cosa resulta muy peligroso. Se produce un aumento del ritmo cardíaco y las respiraciones, se empalidecen las encías y se enfrían. Si se da este caso, le elevaremos las patas traseras por encima de la cabeza, le abrigaremos y le llevaremos urgentemente al veterinario.

#### Ingestión de objetos

Si el perro ha tragado algo que no puede digerir no le provocaremos el vómito ya que podría provocarle lesiones peores. Le llevaremos al veterinario.